



ХЕПИЛОР —

комплексный подход в лечении инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и горла



- ✓ Фарингит¹
- ✓ Ларингит¹
- ✓ Тонзиллит¹
- ✓ Гингивит¹
- ✓ Стоматит¹
- ✓ Афты¹
- ✓ После стоматологических вмешательств¹

ХЕПИЛОР – комплексное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки



Спрей для ротовой полости

Применяют для местного лечения инфекционных заболеваний ротовой полости и глотки: ангины, острые и хронические тонзиллиты, фарингиты, ларингиты, гингивиты.

Взрослым: 1 распыление 4-6 раз в сутки.

Детям старше 12 лет: 1 распыление 2-3 раза в сутки.

ХЕПИЛОР

Антисептический эффект

Гексетидин

Противо-
воспалительный эффект

Холина салицилат

Обезболивающий эффект

Хлорбутанола
гемигидрат



Масло аниса



В состав масла входят анетол (до 80-90%), метилхавикол (до 10%), анисовый альдегид, анисовый кетон, анисовый спирт и анисовая кислота. Анисовое масло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Масло лимона



Лечебное действие лимона объясняется наличием лимонного масла и лимонной кислоты. Большое значение в лечебном действии имеет также аскорбиновая кислота.

Левоментол



Левоментол, активный изомер ментола, получают в виде лечебного масла из растений различных видов мяты. Главным образом он используется для облегчения симптомов, обладает обезболивающим действием.

Эвкалиптол



Эвкалиптол выделяют главным образом из эвкалиптового масла; Эвкалиптол широко используют в медицине благодаря его антисептическим и дезодорирующим свойствам.

Действие препарата Хепилор:

- ✓ Хепилор оказывает комплексное (антисептическое, противовоспалительное, обезболивающее) действие, благодаря чему не требуется дополнительное применение местных препаратов.¹
- ✓ Хепилор оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие, обладает мощным противогрибковым и вируцидным эффектом.²
- ✓ Хепилор проявляет выраженный профилактический эффект в предупреждении развития грибковой инфекции (угнетает рост и размножение более 40 штаммов грибов Candida).⁸

Сравнительная характеристика местных антисептических препаратов:

Эффекты препарата	Гексэтидин ^{4,7}	Препараты йода ^{5,7}	Растительные препараты ⁵	Стрептоцид содержащие препараты ^{5,6}	ХЕПИЛОР ^{1,4}
Антисептический	✓	✓	✓	✓	✓
Противовоспалительный					✓
Обезболивающий	✓				✓

ХЕПИЛОР

Антисептический эффект¹

Благодаря гексетидину, Хепилор обладает антибактериальной и противогрибковой активностью.

Противовоспалительный эффект¹

С воспалительным процессом в ротовой полости борется холина салицилат, входящий в состав Хепилора.

Обезболивающий эффект¹

Хлорбутанола гемигидрат оказывает дополнительную обезболивающую активность.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГЕКСЕТИДИНА

Заключается в конкурентном взаимодействии с тиамином: структура гексетидина схожа со структурой тиамин.¹ Бактерии лишены способности синтезировать все органические соединения и зависят от наличия в среде определенных факторов роста. Тиамин - является незаменимым фактором роста микроорганизмов, поэтому, гексетидин, вступая в конкурентное взаимодействие с тиамином, вызывает гибель бактерий.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛИНА САЛИЦИЛАТА

Ингибирует активность фермента циклооксигеназы ЦОГ1 и ЦОГ2.² Холина салицилат один из немногих противовоспалительных препаратов, который при местном применении всасывается в слизистой оболочке ротовой полости и проникает к нервным окончаниям.⁵

Хлорбутанола гемигидрат обладает местноанестезирующим действием.¹

Действие компонентов Хепилора:^{3,4,5}

- ✓ Лечебный эффект холина салицилата наступает через 2-3 минуты и длится 2-3 часа;
- ✓ После однократного применения, следы гексетидина обнаруживают на слизистой десен в течение 65 часов;
- ✓ В бляшках на зубах активные концентрации гексетидина сохраняются в течение 10-14 часов;
- ✓ При добавлении гексетидина к слюне, через две минуты после начала исследования, количество аэробных микроорганизмов уменьшалось на 86%, анаэробных – на 92%;
- ✓ С. Matula установил, что гексетидин обладает более выраженной антибактериальной активностью, чем перекись водорода и этиловый спирт.


Активные вещества Хепилора фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно освобождаются.¹

- ✓ Применение препарата Хепилор в виде монотерапии или комплексного лечения у больных с патологией глотки и гортани позволило эффективно уменьшить такие симптомы общего и местного воспаления как: боль в горле, сухость и першение, нарушение голосовой функции, подъем температуры тела, гиперемия и налеты в зеве, зернистость задней стенки глотки, регионарный шейный лимфаденит.

По мнению 99% врачей и пациентов лечение Хепилором является эффективным.²


Результаты клинической оценки препарата Хепилор²

ДИНАМИКА ГИПЕРЕМИИ ЗЕВА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОМ²



Гиперемия зева является клиническим проявлением воспаления и его динамика отражает характер и интенсивность воспаления. До начала лечения гиперемия зева была отмечена у 97% обследованных больных, преимущественно в виде интенсивного характера. Применение препарата Хепилор позволяет эффективно уменьшить гиперемия зева.

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА У ПРОЛЕЧЕННЫХ БОЛЬНЫХ²




Температура тела была повышена у 87% обследованных больных в начале заболевания. Из них у 39% пациентов температура была субфебрильная, у 33% пациентов поднялась до 38.5 градусов, у 15% - более 38.5 градусов. К третьему дню лечения температура тела оставалась высокой только у 1% пациентов.

Критерии оценки симптомов: 0 - отсутствие признака; 1 - слабая степень выраженности; 2 - умеренная степень; 3 - выраженная степень

0,59%

Наличие
аллергических
реакций



99,41%

Отсутствие
аллергических
реакций

ПОБОЧНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ²

Очень важно, чтобы медикаментозный препарат не только снимал клинические симптомы воспаления, но и был при этом безопасным. По результатам проведенного исследования только у 0,59% пациентов отмечались побочные аллергические реакции.



Хепилор хорошо переносится и только у 0,59% пациентов отмечались незначительные побочные реакции.²



Препарат Хепилор можно рекомендовать к широкому использованию при различной воспалительной патологии в глотке и гортани.²

Краткая инструкция по применению препарата ХЕПИЛОР

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА:

гексетидин, холина салицилат, хлорбутанола гемигидрат, масло лимонное, масло анисовое, ментол (левоментол), эвкалиптол.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Действие препарата обусловлено тремя активными ингредиентами.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ АКТИВНОСТЬ.

Механизм действия заключается в конкурентном действии с тиаминном: структура гексетидина схожа со структурой тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.

Холина салицилат обладает анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалительным действием.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ.

обеспечивается хлорбутанолом. Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно освобождаются.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Местное лечение инфекционных заболеваний ротовой полости и глотки:

- ангины;
- острые и хронические тонзиллиты;
- фарингиты;
- ларингиты;
- гингивиты;
- стоматиты;
- афты.

Уход за ротовой полостью после стоматологических вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Раствор и спрей применяют детям с 6 лет. Не применять в случае выявленной аллергии и повышенной чувствительности к компонентам препарата.

ОСОБЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Если симптомы сохраняются более 5 дней и/или повышена температура тела, то необходимо пересмотреть тактику лечения.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.

Спрей для ротовой полости



Возраст применения с 6 лет. Применяют местно для орошения ротовой полости.

Взрослым и детям старше 15 лет:

1 распыление 4-6 раз в сутки.

Детям от 6 до 15 лет: 1 распыление 2-3 раза в сутки.

Курс лечения не более 5 дней.

Раствор для полоскания ротовой полости

Применяют с 6-летнего возраста. Для однократного полоскания ротовой полости: налить раствор в мерный стаканчик до деления 10 мл и растворить в 50 мл теплой воды или 2 чайных ложки препарата растворить в 1/4 стакана теплой воды. От 2 до 4 полосканий в сутки. Не глотать.



Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности или кормления грудью препарат применяют только по назначению врача и только в том случае, когда польза от применения препарата для матери превышает риск для плода.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

Сообщений о передозировке препарата не было.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Препарат может вызвать аллергические реакции; возможно нарушение вкусовых восприятий и обоняния.

СРОК ГОДНОСТИ.

2 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать.

КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА.

Без рецепта.

¹Инструкция по медицинскому применению.

²"Анализ многоцентрового клинико-эпидемиологического исследования основных заболеваний глотки и гортани в 22 регионах Украины", Научно-практический журнал "Семейная медицина", №1, 2013(45) Координатор исследовательской программы Пухлик С. М. профессор зав. кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета.

³Медведева М. Б. Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца "Современные подходы к комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта" медицинская газета "Здоров'я України" тематический номер "Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія №4", грудень 2011р.

⁴Bokor M. The effect of hexetidine spray on dental plaque following periodontal surgery// J.Clin. periodontal. - 1996. - 23(12). - P.1080-1083. Matula C.,Hildebrandt M., Nahler G. Decontamination of the oral cavity/ Effect of sixlocal anti-microbial preparations in comparison to water and parafilm as control// J. Int. Med. Res. - 1988. - 16(2). - P. 98 - 106. Wile D. B., Dinsdale J. R. Joynson D. H. Investigation of antibacterial and antifungal properties on the oral flora in healthy subjects// Curr. Med. Res. Opin. - 1986. - 10(2). - P.82-86

⁵Нестерчук В. І. ГУ Інститут отоларингології ім. Коломийченко НАМН України м. Київ. - "Местная антибактериальная терапия: максимум эффективности в очаге поражения, минимум негативных системных эффектов" - медицинская газета "Здоров'я України" тематический номер "Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія №3", вересень 2011р.

Спрей Р.С. МОЗ України №UA/10910/01/01 от 15.09.2010 г.

Раствор Р.С. МОЗ України №UA/10910/02/01 от 20.10.2010 г.

Информационный материал для распространения на конференциях, семинарах, симпозиумах по медицинской тематике.

По поводу более детальной информации относительно препарата смотрите инструкцию по медицинскому применению препарата.

Информационный материал исключительно для врачей.